



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

# **APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALL'ANEMIA SIDEROPENICA: UNA PATOLOGIA FREQUENTE E CURABILE**

## **ESPERIENZE IN PRONTO SOCCORSO**

### **DEA ASST MANTOVA**

**Dott. Angela Furini – ASST Mantova- DEA - 29 Novembre 2019 Hotel Hilton Milano**

# LG NICE 2015

Novembre 2016

LA GESTIONE DEL PAZIENTE ANEMICO IN PRONTO SOCCORSO: FERRO VS SANGUE


Mario Guarino direttore OCT Napoli




Maggio 2019

ABS096  
TERAPIA MARZIALE ENDOVENOSA CON FERROCARBOSSIMALTOSIO IN PAZIENTI CON ANEMIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA DI MANTOVA  
Capuzzo E.<sup>(1)</sup>, Furini A.<sup>(2)</sup>, Frattini F.<sup>(1)</sup>, Sissa C.<sup>(1)</sup>, Montorsi P.<sup>(1)</sup>, Al-Khaffaf A.Z.T.<sup>(1)</sup>, Mimiola E.<sup>(1)</sup>, Franchini M.<sup>(1)</sup>, Luppi M.<sup>(2)</sup>  
<sup>(1)</sup>SIMT, ASST Mantova, Mantova; <sup>(2)</sup>Pronto Soccorso, Emergenza Urgenza, ASST Mantova, Mantova

## Consumo ferrocarbrossimaltoso vs sodio ferrogluconato DEA fino a ottobre '19.



## SACCHE EMAZIE CONCENTRATE UTILIZZATE IN DEA



## Caso clinico

D. T. 65 aa ♀

APR: Asma trattata con broncodilatatore spray ab, NIDDM  
Non eseguiva esami da circa 10 anni.

APP

recente astenia e dispnea da sforzo **Hb 5.8 grammi/dl** con MCV 71, PLTS  
590.000/mmc, GB 6630/mmc con formula conservata.

**13/11/2019** inviata in PS >, confermato il valore di valore di emoglobina viene  
somministrato ferrocabossimaltoso 1000 mg.

Dimessa con prescrizione di visita ematologica ed esami ematochimici a 1  
settimana dalla dimissione.

**18/11/2019** visita ematologica

## CONCLUSIONI :

l'introduzione della terapia endovenosa marziale con ferro carbossimaltoso ha contribuito alla **riduzione** del consumo delle sacche di emazie concentrate utilizzate presso il PS con conseguente **riduzione** dei tempi di permanenza del paziente

# Considerazioni

La collaborazione col Servizio Trasfusionale per l'attuazione di un percorso preferenziale di presa in carico dei pazienti rende possibile la dimissione precoce anche del paziente con anemia severa diversamente destinato ad essere accolto in osservazione breve (?) o ad essere ricoverato.

# Considerazioni

## American Heart Journal

Volume 169, Issue 2, February 2015, Pages 266-273

---

Clinical Investigation

Acute Ischemic Heart Disease

### Translation of acute coronary syndrome therapies: From evidence to routine clinical practice

Martin Putera MD <sup>a</sup> ... Bimal R. Shah MD, MBA <sup>b, c</sup>  



# Considerazioni

The time to meaningful uptake of class I A therapies into clinical practice took a median of **16 years**.

This significant time lag indicates systemic barriers to the translation of therapeutics into routine clinical practice.